

Coffea Praeparata

Vloeistof voor orale toepassing bij dieren

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

SaluVet GmbH
Stahlstraße 5,
88339 Bad Waldsee
Duitsland

2. BENAMING VAN HET HOMEOPATHISCH DIERGENEESMIDDEL

Coffea Praeparata
Oplossing voor oraal gebruik bij dieren

3. GEHALTE AAN ACTIEVE EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per 100 ml:

Actieve bestanddelen:

Decoctum uit Coffea arabica tosta
(verhouding coffea tot decoctum = 1:3)
100,0 ml

Donkerbruine, dun vloeibare oplossing
Er kan eventueel bezinsel optreden, dit heeft geen effect op de kwaliteit en de effectiviteit van het homeopathisch diergeneesmiddel.

4. INDICATIES

Volgens de antroposofische kennis van de natuur:

Ter harmonisering van het metabole en neuro-sensorische systeem, door versterking van het ritmische systeem:
– voorbehoedend en ter behandeling van diarree en luchtwegaandoeningen van jonge dieren

Als ondersteunende therapie bij:

- verstoringen van de algemene gezondheidstoestand
- aandoeningen gepaard gaand met koorts
- doorbloedingsstoornissen
- afgenomen eet en zuigbehoefte
- verstoring van de gastro-intestinale motiliteit
- luchtwegaandoeningen

De toepassing van dit antroposofische diergeneesmiddel in genoemde toepassingsgebieden is uitsluitend op lange traditie gebaseerd. Bij ernstige vormen van deze ziekten, is klinisch onderbouwde therapie geïndiceerd.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij bloedvergiftiging en maag/darmzweren.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de actieve bestanddelen.

6. BIJWERKINGEN

Gastro-intestinale klachten zijn mogelijk door een verhoogde secretie van maagsap.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paard, rund, schaap, geit, hond, kat, konijn, varken, cavia

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Voor oraal gebruik

Afhankelijk van doeldiersoort en lichaamsgewicht bedraagt de dagdosering:

Paard	50-100 ml p.o.
Veulens	10-20 ml p.o.
Rund	50-100 ml p.o.
Kalveren	10-20 ml p.o.
Schapen, geiten	5-20 ml p.o.
Lammeren	1-5 ml p.o.
Varken	10-50 ml p.o.
Biggen	1-5 ml p.o.
Hond	1-10 ml p.o.
Pups	0,1-0,2 ml p.o.
Kat	0,5-2,5 ml p.o.
Konijn	1-2 ml p.o.
Cavia	0,5-1 ml p.o.

Schudden voor gebruik!

Frequentie en duur van de toepassing:
De aangegeven dagelijkse dosis kan in een keer worden toegediend of verdeeld in 2 tot 3 porties gedurende de dag. Toedienen tot genezing, maar niet langer. Spoel de doseerspuit na elke gebruik om met kraanwater.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Neem contact op met uw dierenarts als de symptomen aanhouden of als het verwachte effect niet optreedt. Het preparaat mag niet langdurig worden toegediend zonder overleg met de dierenarts.

10. WACHTTIJD

Nul dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAAT- REGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

U mag dit diergeneesmiddel niet meer gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die vermeld staat op de doos en het etiket van de verpakking. Houdbaarheid na eerste opening van de fles: 12 weken

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Toepassing van het diergeneesmiddel moet volgen op advies van een dierenarts en vervangt niet overige door de dierenarts geadviseerde diergeneesmiddelen en maatregelen. De juiste inzet van het diergeneesmiddel is alleen dan gegaandeerd als de oorzaken van de ziekte opgehelderd zijn en de ernst van de ziekte vakkundig ingeschat is en een dienovereenkomstig behandelplan is opgesteld. Bij het stellen van de diagnose en de keuze voor de diergeneesmiddelen is het van belang rekening te houden met de antroposofische kennis van de natuur en geneesmiddelkeuze. Derhalve is een consultatie van een dierenarts voor het opstellen van een behandelplan te adviseren.

De behandelend dierenarts moet dringend opnieuw geconsulteerd worden bij:

- Hoge of aanhoudende koorts
- Acute en ernstige lokale ontsteking
- Acute of ernstige stoornissen van de bloedsomloop
- Acute of aanhoudende ademhalingsproblemen
- Aanhoudende of juist afwezige defecatie
- Bloedige ontlasting
- Ernstige aantasting van de algehele gezondheidstoestand
- Aanhoudende, onduidelijke periodieke symptomen of nieuwe symptomen.

In de volgende ziekten moet het diergeneesmiddel alleen als ondersteunende behandeling worden gebruikt:

- deficiëntie als gevolg van verminderde opname van essentiële voedingsstoffen
- omstandigheden die een chirurgische ingreep vereisen, zoals een darmobstructie door opname van een voorwerp of een darmverdraaiing (bij alle genoemde doeldiersoorten).

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Bij dracht en lactatie advies van een dierenarts inwinnen.

Interactie(s) met andere ge- neesmiddelen en andere vormen van interactie

Door het gehalte aan cafeïne kan het tot een versterking van de werking van Digitalispreparaten en β -receptorblokkerende sympathicolitica (bètablokkers) komen.

Onverenigbaarheden

Vermenging met andere geneesmiddelen moet worden vermeden vanwege een mogelijk risico op onverenigbaarheden.

13. SPECIALE VOORZORGSMAAT- REGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGE- NEESMIDDELEN OF AFVALMATER- IAAL VOORTKOMEND UIT HET GE- BRUIK VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJS- LUITER VOOR HET LAATST IS HER- ZIEN

6 oktober 2020

15. OVERIGE INFORMATIE

Verpakkingsgrootten:

20 ml
100 ml
4 x 100 ml
6 x 100 ml
10 x 100 ml
20 x 100 ml

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL H 114741

KANALISATIE
UDA

2020-10-00