

Pyrogenium Compositum

Injectievloeistof voor rund, paard, varken, schaap en geit

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

SaluVet GmbH
Stahlstraße 5
88339 Bad Waldsee
Duitsland

2. BENAMING VAN HET HOMEOPATHISCH DIERGENEESMIDDEL

Pyrogenium Compositum
Injectievloeistof voor rund, paard, varken, schaap, geit

3. GEHALTE AAN ACTIEVE EN OVERIGE BESTANDDELEN

10 gram (gelijk aan 10,2 ml injectievloeistof) bevat:

Actieve bestanddelen:

Argentum Metallicum Dil. D30	3,30 g
Lachesis mutus Dil. D8	3,30 g
Pyrogenium-Nosode Dil. D15 (HAB, Vs. 44)	3,30 g

Hulpstof met bekend effect: Ethanol, 20% (m/m) Isotonische natriumchloride oplossing (0,09 g/10 ml)

4. INDICATIES

Rund:

De indicaties zijn afgeleid van veterinaire homeopathische geneesmiddelbeelden. Daartoe behoren: Ziekten met koorts, verminderd algemeen welbevinden door plaatselijke ontstekingen, zoals vierontsteking, baarmoederontsteking, tussenklauwontsteking, luchtweginfecties.

Paard, varken, schaap en geit:
Homeopathisch geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik zonder goedgekeurde therapeutische indicaties toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Geen bekend.

6. BIJWERKINGEN

Experimenteel onderzoek bij kalveren heeft aangetoond dat een tijdelijke lichte zwelling op de injectieplaats kan optreden na injectie van dit homeopathisch diergeneesmiddel, die gepaard kan gaan met roodheid. Tijdens de injectie, en kort daarna kan voorbijgaande, lichte pijn optreden.

Opmerking: Bij behandeling met homeopathische diergeneesmiddelen kunnen bestaande klachten en symptomen eerst tijdelijk erger worden (beginverergering). Indien dit niet verdwijnt dient u de behandeling te staken en uw dierenarts te raadplegen.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, paard, varken, schaap, geit

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor subcutane injectie.

Dosering:

Overeenkomstig de doeldiersoort en in afhankelijkheid van lichaamsgewicht bedraagt de enkelvoudige dosis:

Rund	10 ml
Kalf	5 ml
Paard	10 ml
Varken, schaap, geit, veulens	5 ml
Big, (geiten)lam	1 ml

De enkelvoudige dosis aan het begin van de behandeling eenmaal daags, vervolgens bij optredende verbetering met tussenpozen van enkele dagen toepassen.

Opeenvolgende injecties moeten op afzonderlijke injectieplaatsen worden uitgevoerd.

De toediening van dit homeopathisch diergeneesmiddel mag niet langer dan tot volledige genezing van het dier.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Zie onder dosering.

Win bij onduidelijkheden professioneel advies in.

Bij aanhoudende klachten of als het verwachte effect niet optreedt, neem contact op met uw dierenarts.

10. WACHTTIJD

Nul dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAAAT-REGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 12 weken

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Subcutane injecties mogen alleen worden uitgevoerd door dierenartsen of andere personen die de injectietechniek goed beheersen.

Door het ethanolgehalte (20% m/m) kan bij subcutane injectie een tijdelijke zwelling op de injectieplaats ontstaan.

De oorzaken van de klachten moeten zo veel mogelijk worden opgehelderd voordat de behandeling begint. Het gebruik van dit product mag geen andere door een dierenarts voorgeschreven medicijnen en maatregelen vervangen.

Bij aanhoudende, onduidelijke, periodiek optredende of nieuwe klachten, in het bijzonder bij:

- Aanzienlijk vergrote lymfeklieren
- Massieve en aanhoudende etterende ontstekingen
- Hoge koorts en meer dan 3 dagen aanhoudende koorts
- Sterke tekenen van infectie zoals roodheid, warmte, zwelling, pijn en disfunctie
- Ernstige verslechtering van de algehele conditie

moet u een dierenarts raadplegen, omdat het een medische aandoening kan betreffen waarbij een medische diagnose noodzakelijk is en antibiotica of chirurgische behandeling nodig kan zijn.

Bij de volgende ziekten moet dit homeopathisch diergeneesmiddel alleen gebruikt worden voor ondersteunende behandeling:

- Deficiëntie door verminderde absorptie van essentiële voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en sporenelementen
- Ziekten die chirurgische behandeling vereisen, zoals abscessen, pyometra en interdigitaal flegmoon.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het homeopathisch diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Dit product bevat 20 volume % alcohol. Zwangere vrouwen dienen voorzichtigheid te betrachten bij toediening van dit product.

Dracht en lactatie

Bij gebruik tijdens dracht en lactatie advies van een dierenarts inwinnen. De veiligheid is niet bewezen tijdens de dracht en lactatie. Dit product bevat 20 volume % alcohol.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen bekend.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Geen informatie beschikbaar.

Belangrijke onverenigbaarheden
Geen bekend.

13. SPECIALE VOORZORGSMAAAT-REGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIER-GENEESMIDDELEN OF AFVAL-MATERIAAL VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN HET DIER-GENEESMIDDEL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

6 oktober 2020

15. OVERIGE INFORMATIE

REG NL H 120298

KANALISATIE

UDA

Verpakkingsgrootten:

Omdoos met 1 x 100 ml fles
Omdoos met 4 x 100 ml fles
Omdoos met 6 x 100 ml fles
Omdoos met 10 x 100 ml fles
Omdoos met 20 x 100 ml fles

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.